



P.O. Box: 48577, **DUBAI**, U.A.E.  
 Tet: 04 267 8866, Fax: 04 267 8855  
 P.O. Box: 457, **SHARJAH**, U.A.E.  
 Tet: 06 565 8866, Fax: 06 565 6699

ص.ب: ٤٨٥٧٧ - دبي، ا.ع.م.  
 هاتف: ٠٤ ٢٦٧ ٨٨٦٦ - فاكس: ٠٤ ٢٦٧ ٨٨٥٥  
 ص.ب: ٤٥٧ - الشارقة، ا.ع.م.  
 هاتف: ٠٦ ٥٦٥ ٨٨٦٦ - فاكس: ٠٦ ٥٦٥ ٦٦٩٩

E-mail: info@zulekhahospitals.com • Website: www.zulekhahospitals.com



## **TUBERCULIN/MANTOUX TEST**

It is a screening test for diagnosis of tuberculosis

You will be administered a standard dose of medicine on a forearm

You are required to visit the laboratory within 48 – 72 hrs of injection to see the response to the medicine injected

Delay in reporting may invalidate the test

The test area may become slightly red or mildly swollen.

Please do not:

- scratch
- apply hot bags (heat)
- soap
- apply any medication at the test area.

If any severe reactions like blister formation or pus formation at the test area, report immediately to doctor instead of waiting till recommended 48 to 72 hours.

### **(Patient Appointment)**

Patient Name: .....

Sign:.....Patient Visit Date & Time .....

(Please contact Laboratory for any change in Date/ Time )

Technician Name and Sign.

## فحص السل

هو فحص للكشف عن مرض السل.

ستعطى جرعة محددة من دواء معين في الذراع ثم سيطلب منك التوجه للمختبر بعد مرور ٤٨ - ٧٢ ساعة وستعطى حقنة لتقييم ردة الفعل تجاه الدواء المحقون.

إن التأخر في التوجه للمختبر قد يبطل مفعول الفحص.

قد تحمر بعض الشيء منطقة الفحص أو تتورم قليلاً.

إن حدث، من فضلك:

- لا تحك
- لا تضع عليها كمادات ساخنة
- لا تغسلها بالصابون
- لا تضع أي أدوية أو كريمات على نفس منطقة الحقنة.

في حال حدوث ردة فعل قوية في منطقة الفحص كتكون نفاطات معبأة بالماء، أو تكون فيح بداخلها، راجع طبيبك فوراً قبل مرور ال ٤٨ أو ٧٢ ساعة المطلوبة منك.

(موعد المريض)

إسم المريض: ..... التوقيع: .....

تاريخ ووقت زيارة المريض: .....

(من فضلك راجع المختبر في حال تغيير الوقت أو التاريخ)

إسم الموظف وتوقيعه: .....