



دوالي الحبل المنوي

P.O. Box: 48577, DUBAI, U.A.E.

Tel: 04 267 8866, Fax: 04 267 8855

P.O. Box: 457, SHARJAH, U.A.E.

Tel: 06 565 8866, Fax: 06 565 6699

E-mail: info@zulekhahospitals.com • Website: www.zulekhahospitals.com

ص.ب: ٤٨٥٧٧، دبي، إ.ع.م.

هاتف: ٤٣٧٨٨٦٦ - ٤٣٧٨٨٥٥ . فاكس: ٤٣٧٨٨٥٥

ص.ب: ٤٥٧، الشارقة، إ.ع.م.

هاتف: ٦٥٦٥٨٨٦٦ - ٦٥٦٥٦٦٩٩ . فاكس: ٦٥٦٥٦٦٩٩

الدوالي هي عبارة عن توسيع في حجم الأوعية الدموية لشرايين كيس الصفن ويؤدي إلى جفاف الخصيتين. الأوعية الدموية للخصيتين هي بالأصل من منطقة البطن، وتمتد للأسفل لتصل إلى الخصيتين عبر القناة الأنوية كجزء من الحبل المنوي المتصل بالخصيتين. ويحدث هذا التوسيع كنتيجة للخلل في وظيفة الصمامات التي تمنع دم الخصية من العودة إليها. فعندما تتعطل يصعب على الدم الخارج من الخصية الصعود إلى الحبل المنوي تتكون بالتالي الدوالي.

وتبدأ الدوالي بالتكون بشكل تدريجي، وقد لا يكون لديها أعراض محسوسة. وقد لوحظ أن هذه الحالة تنتشر أكثر بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ - ٣٠ عاماً. ونادرًا ما تحدث بعد تجاوز عمر ٤٠ عاماً. وتمثل نسبة إصابة الذكور بها من ٢٠ - ٤٠٪، ولدى الذكور الذين يعانون من ضعف في الخصوبة.

والنوع الآخر من دوالي الحبل المنوي يحدث نتيجة للضغط الوريدي في التصريف من الخصية. فيتراوح سمك الأوعية الدموية الدقيقة في الخصية تقريباً من ٠.٥ - ١.٥ مم. والتوسيع إلى أكثر من ٢ مم في الشريان الدموي هو ما يعرف بالدوالي. والكشف عن هذا التوسيع هو أمر بسيط جداً يتم من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية والذي يظهر بشكل واضح توسيع الشريان لأكثر من ٢ مم. وتكون أسهل إذا قام المريض ببعض الحركات المناورة (فالسالفا) كالشد مثلاً، كأنه يقوم ببعض الجهد يحاول من خلاله تحريك الأمعاء، أو الوقوف كأنه في اختبار. كلتا الحالتين من شأنها رفع معدل ضغط الدم على أوعية الدم وبالتالي بروز الأوعية أكثر. كما وتوجد طريقة تشخيصية أخرى، لا وهي التصوير بجهاز دوبлер، وهو جهاز يمكن من خلاله قياس سرعة تدفق الدم في الأوعية. كما يمكن رؤية جري إتجاه الدم ذهاباً وإياباً عند القيام بحركة فالسالفا، وبالتالي يرفع من حساسية ومصداقية الفحص التشخيصي.

(عملية ربط الدوالي)، هي إحدى العمليات الجراحية لعلاج الدوالي والتي لا تحتاج إلى إدخال سابق للمستشفى. ويمكن أن تجرى من ثلاثة مناطق محددة. منطقة الفخذ الأنفي، ومنطقة البطن، أو منطقة تحت الأنفي. وتوجد عدة طرق ممكن بواسطتها إجراء العملية. كما ويجب وضع أكياس من الثلج على المنطقة لمدة ٢٤ ساعة الأولى من بعد العملية لتخفييف التورم في المكان. قد يطلب من من بعض المرضى إرتداء حزام خاص حامل لخصوصية لبعض الوقت بعد العملية. توجد بعض المضاعفات الممكن ترتبها على العملية وهي تشمل النزيف، تجمع ماء في منطقة الخصيتين، الإلتهاب، تعرض خلايا الخصية أو بنيتها للإصابة. بالإضافة إلى إمكانية إصابة الأوردة التي تغذي الخصيتين. ومن الخيارات البديلة للجراحة عملية القسطرة والتي يطلق عليها embolization وهي من الخيارات الأقل ضرراً المتاحة لعلاج دوالي الحبل المنوي.

إن عملية القسطرة هي خيار مناسب كمتابعة لما بعد العملية الجراحية لربط الدوالي. وهي ملائمة للدوالي التي تظهر مجدداً بعد علاجها جراحياً مسبقاً. عموماً، دوالي الحبل المنوي أو الخصيتين هي حالة صامتة ولا تسبب الشعور بالألم. ولكن في بعض الحالات قد يشعر المرضى بالإلم بسببها وقد تسبب العقم. وقد أظهرت الدراسات بالرغم من ذلك تحسناً في جودة الحيوانات المنوية بنسبة ٥٧٪.