



## الربو عند الأطفال

P.O. Box: 48577, DUBAI, U.A.E.  
Tel: 04 267 8866, Fax: 04 267 8855  
P.O. Box: 457, SHARJAH, U.A.E.  
Tel: 06 565 8866, Fax: 06 565 6699  
E-mail: info@zulekhahospitals.com • Website: www.zulekhahospitals.com

ص.ب: ٤٨٥٧٧، دبي، إ.ع.م.  
هاتف: ٤٣٧٨٨٦٦ . فاكس: ٤٢٦٨٨٥٥  
ص.ب: ٤٥٧، الشارقة، إ.ع.م.  
هاتف: ٦٥٦٥٨٨٦٦ . فاكس: ٦٥٦٥٦٦٩٩

الربو عند الأطفال هي حالة طارئة تستدعي التوجّه فوراً إلى المستشفى وربما الإقامة في المستشفى والتغيب عن الدراسة. لسوء الحظ، إذا تعرض الطفل للإصابة بالربو منذ الطفولة فإن هذه الحالة قد تستمر معه لمرحلة الكبر، ولكن مع العلاج الصحيح وتدارك الأعراض بشكل سليم، يمكن تفاديه تعرّض الرئّة للأذى.

### علاج الربو

يتمثل علاج الربو الوقاية من الأعراض وعلاج نوبة الربو لحظة حدوثها. إن أدوية الوقاية طويلة الأمد تخفف من التهاب الشعب الهوائية لطفلك والتي يمكن وبالتالي أن تسبب في حدوث الأعراض. بينما تقوم الأدوية سريعة المفعول بفتح مجاري الهواء المتورمة والتي تعيق التنفس.

يؤثر أسلوب الحياة والعلاج المنزلي بشكل كبير في الوقاية من الربو.

- الحفاظ على مستوى الرطوبة المنخفضة في جو المنزل، بإستخدام جهاز خاص لإزالة الرطوبة.
- الحفاظ على نظافة الأبواب الداخلية، وصيانة مكيف الهواء والمدفأة والتأكد من نظافتها بشكل يومي.
- تجنب إقتناء الحيوانات المنزلية
- إستخدم مكيف الهواء، فجهاز التكييف يقوم بشفط الغبار أو الأنتربي موجودة داخل المنزل.
- قم بتنظيف المنزل على الأقل مرة في الأسبوع لإزالة الغبار والأنتربي المسببة للحساسية.
- اجعل من المنزل صديق للربو، بإستخدام الأشياء التي لا تسبب الحساسية ولا تهيّج أعراض الربو، كأغطية الوسائد، أو الشراشف ومراتب السرير. وتفادى وضع السجاد خصوصاً في غرفة الطفل. إستخدم الستائر القابلة للغسيل بسهولة.
- تجنب قدر الإمكان تعرّض الطفل للهواء البارد، أو الجاف، يمكنه إرتداء قناع واقٍ للربو.
- انتظم بالعلاج كجزء من الحياة.
- احرص على مزاولة طفلك للتمارين الرياضية.
- حافظ على الوزن المثالي للطفل.

### أعراض الربو

- حكة متكررة متقطعة
- صوت مت烜ّج أو كالصفير
- ضيق في الصدر
- ألم في الصدر، خصوصاً لدى الأطفال صغار السن
- صعوبة في النوم نتيجة للصعوبة في التنفس، والكحة
- وصوت الصفير
- تأخر في التعافي أو التهاب الشعب الهوائية بعد التهاب الرئة
- إرهاق نتيجة للصعوبة في النوم
- صعوبة في التنفس والتي تسبّب تفادي اللعب أو القيام بأي مجهود بدني

### عوامل الخطر

- التعرض لدخان السجائر
- ردة فعل سابقة للحساسية، كردة الفعل المعاكسة لحساسية الجلد، أو حساسية الطعام، أو التهاب الشعب المخاطية.
- تاريخ عائلي سابق لإصابة بالربو، أو التهاب الشعب المخاطية، أو الأكزيما
- الإقامة في منطقة بعيدة والتعرض أكثر لتلوث الهواء
- الولادة بوزن قليل
- البدانة
- سيلان الأنف المزمن أو التهاب الشعب المخاطية
- التهاب الجيوب الأنفية
- حرقة بالمعدة
- إلتهابات فيروسية عادمة، كالرشح الحساسية من الغبار، أو فرو الحيوانات الأليفة، أو البقاحات النباتية
- تغيرات الجو أو الهواء البارد